home Illuminé™

Geles de blanqueamiento dental para tratamiento en casa

Los geles de blanqueamiento dental Illuminé™ home se pueden emplear sólos o tras el tratamiento con un blanqueamiento dental en la consulta.

Los geles de blanqueamiento dental Illuminé home contienen como ingrediente activo peróxido de carbamida, que ha demostrado ser el producto más efectivo como blanqueamiento en casa para el tratamiento del cambio de color dental.

El gel de blanqueamiento dental Illuminé home 10% contiene peróxido de carbamida al 10%, liberando H_2O_2 en una concentración de alrededor del 3,6%.

El gel de blanqueamiento dental Illuminé home 15% contiene peróxido de carbamida al 15%, liberando H_2O_2 en una concentración de alrededor del 5,4%, así como fluoruro sódico.

COMPOSICION

Illuminé home 10%:
Peróxido de cabamida al 10%
Glicerina
Carboxipolimetileno
Hidróxido sódico
Agua
Aroma de menta

Illuminé home 15%:
Peróxido de carbamida al 15%
Glicerina
Carboxipolimetileno
Hidróxido sódico
Agua
Aroma de menta
Fluoruro sódico

Ambos geles de blanqueamiento dental Illuminé tienen un pH de aproximadamente 6,0.

INDICACIONES

1. Cambio de color dental debido a:
   - Tinción por alimentos, bebidas y tabaco, con penetración en la estructura dental
   - Cambios degenerativos por la edad
   - Por el tratamiento con tetraciclina (de primer y segundo grado) o minociclina
   - Fluorosis, especialmente pigmentación marrón
   - Necrosis pulpar y/o tratamiento endodóntico.
2. Enmascaramiento del modelado del esmalte.
3. Dientes oscuros determinados genéticamente.
4. Blanqueamiento de dientes con color alterado previo a tratamiento restaurador o prostodóntico, por ejemplo carillas.

Los mejores resultados se obtienen en pacientes cuyos dientes han virado a amarillo, naranja o marrón claro.

CONTRAINDICACIONES

1. Uso durante el embarazo o lactancia.
2. Alergia conocida al peróxido de hidrógeno u otros ingredientes de los productos.
3. Tinción extrínseca que se pueda eliminar mediante productos de limpieza dental profesional (ej. Gel Nupro®) y que pueda prevenirse mediante una adecuada higiene oral.
4. Uso en fumadores recalcitrantes, a menos que dejen el consumo de tabaco durante el tratamiento.

ADVERTENCIAS

1. Illuminé home contiene peróxido de carbamida, que puede ser irritante. Evite el contacto con los tejidos orales, ojos y piel. Si se produce un contacto accidental, lave con agua la zona afectada. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua abundante y acuda al médico.
2. Las razones de la tinción o decoloración deben ser conocidas para evitar el enmascaramiento de condiciones patológicas.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES

1. Se debe advertir a los pacientes de la sensibilidad potencial de los dientes y encías durante el tratamiento.
2. Antes del blanqueamiento se deben tratar y reparar caries, roturas del esmalte y zonas con dentina expuesta para reducir la probabilidad de que el material alcance la pulpa produciendo hipersensibilidad o reacción inflamatoria.
3. Evitar la exposición de dientes con hipersensibilidad conocida y dientes con cavidades pulpares expuestas al agente blanqueador.
4. Asegurar la colocación adecuada de las cubetas para reducir la probabilidad de desbordamiento del material, reduciendo la cantidad de material y evitando el contacto gingival.
5. Se debe tener especial cuidado durante la inserción de la cubeta, eliminando el exceso de material y limpiando el material que pueda haberse depositado sobre la mucosa, evitando el contacto con la piel y los ojos.
6. Si un paciente experimenta sensibilidad o disconfort en los dientes o encía durante el tratamiento con Illuminé home, se recomienda lo siguiente:
   El paciente deberá contactar con el dentista para recibir instrucciones sobre los pasos a seguir.
   En caso de sensibilidad dental, emplear menos cantidad de Illuminé home siguiendo las instrucciones del fabricante.
   En caso de sensibilidad gingival, hay que estar seguro de que la cubeta del gel no se apoye en la encía marginal. En caso de que eso ocurra, habrá que rebajar la cubeta.

INTERACCION CON MATERIALES DENTALES

Las restauraciones coloreadas existentes no igualarán el color de los dientes tras el tratamiento y puede que se requiera reemplazarlas.
Illuminé home se debe usar antes de aplicar composites, carillas o coronas para mantener un color adecuado del diente. También recomendamos que el paciente espere un mínimo de 2 semanas de estabilización del color tras el tratamiento, antes de realizar restauraciones en anteriores.
Algunas restauraciones antigüas (ej. amalgamas) pueden dejar tinciones oscuras en la cubeta; es normal e inocuo.

REACCIONES ADVERSAS

Los pacientes pueden experimentar sensibilidad por el uso de productos con peróxido de carbamida (superficies radiculares expuestas, restauraciones con microfiltración, dentina expuesta, areas linguales labiales expuestas).

Se puede presentar irritación de la mucosa oral. En caso de que se aplique excesiva cantidad de gel, se puedes presentar náuseas o vómitos. Elimine el exceso de gel tras la inserción de la cubeta con los dedos o un pincel.

Si a pesar de que se han tomado todas las precauciones, continúa la sensibilidad del diente o la irritación de la mucosa oral, el paciente debe discontinuar el tratamiento y consultar con el dentista. En estos casos debe considerarse la suspensión del tratamiento.

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA SU USO EN CLINICA

Consulta inicial

1. Revisar la historia dental y médica del paciente.
2. Realizar un examen intraoral de la salud dental, periodontal y tejidos blandos.
3. Informar a los pacientes sobre que el periodo de tratamiento normal esperado en casos estándar es de una o dos semanas. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la tinción, se puede requerir un tratamiento de entre seis semanas a seis meses, para obtener el efecto deseado.
4. Se recomienda una profilaxis completa (usando Nupro Prophy Paste), y un tratamiento fluorado antes de comenzar el proceso de blanqueamiento.
5. El procedimiento completo debe discutirse con el paciente, revisando cualquier problema potencial y efectos adversos.
6. Suministrar al paciente el folleto de información para casa de Illuminé.
7. Informar al paciente de que el color de cualquier restauración estética anterior, puede no tener el mismo color que los dientes después del blanqueamiento y puede requerir ser reemplazada.
8. Use una guía de color adecuada, ej. Biodent[1] o Vita[2] Lumin Vacuum shade guide, para determinar el color en el momento inicial. Anote el diente a tratar y el color actual y deseado en el cuaderno del paciente.

Toma de impresión

Tomar una impresión del arco a tratar con alginato o elastómero (se recomienda que se trate una arcada cada vez, de forma que el paciente pueda ver los progresos).

INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACION Y COMUNICACIÓN CON EL TECNICO DEL LABORATORIO DENTAL

El kit de inicio de Illuminé home incluye una guía de instrucciones para la fabricación de la cubeta. Rellene la tarjeta de instrucciones que se haya en la última página de esta manual de instrucciones para aclarar al técnico dental los dientes a tratar. De este modo, suministrará instrucciones claras para la fabricación de la cubeta cuando realice su pedido.

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA EL PACIENTE

Las instrucciones paso a paso para el paciente incluyen las siguientes instrucciones. Por favor, instruya a su paciente en la siguiente forma:

Guía de aplicación del blanqueamiento

1. Cepillar y usar la seda dental por los dientes antes de colocar la cubeta.
2. Antes de la primera aplicación de cualquier jeringa de Illuminé home, reemplace el tapón con uno de los aplicadores suministrados.
3. Abrir el aplicador rompiéndole la punta (guarde la punta para cerrar el aplicador tras el uso de la jeringa).

---

[1] DENTSPLY DeTrey, Dreieich (D).
[2] Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

4. Siguiendo las instrucciones de su dentista, ponga una pequeña cantidad de gel en el lado frontal de la cubeta, donde se alojarán los dientes. NO rellenar demasiado la cubeta. Cerrar el aplicador de la jeringa y guardar la jeringa para la siguiente aplicación hasta que se vacíe. Cada jeringa contiene aproximadamente para 3-5 aplicaciones.
5. Insertar la cubeta con el gel en la boca. Elimine el exceso de material de la encía o tejido con su dedo o un cepillo dental.
6. Mantenga la cubeta colocada durante la noche o como le indique su dentista (se sugiere un mínimo de 2 horas).
7. No comer o beber o fumar mientras esté usando la cubeta.
8. Tras el tratamiento, retirar la cubeta y lavar los dientes, cepillando y eliminando cualquier resto de gel.
9. Limpie la cubeta con agua caliente y un cepillo dental. Seque la cubeta a continuación y guárdela en su funda.

ALMACENAMIENTO

Antes de su uso por el paciente, Illuminé home debe mantenerse refrigerado (2 - 8 °C). De este modo, se mantendrá la vida media del gel y se asegurará la efectividad máxima del producto.
Mantenga el estuche de Illuminé home lejos del calor o de la luz del sol en todo momento.

NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD

Se debe indicar el número de lote en toda la correspondencia que requiera la identificación del producto.
No usar tras la fecha de caducidad.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con:

Fabricante:
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
ALEMANIA
Tel. +49 (0) 75 31 5 83-0

Distribuidor:
DENTSPLY DeTrey Sàrl
Baar Office
Oberdorfstrasse 11
6342 Baar
SUIZA
Tel. +41 (0) 41 7 66 20 66

© DENTSPLY DeTrey 2001-02-14